



Temaark Kjøttproduksjon på kjøttfekviger



Nortura
bondens selskap

Halvparten av slaktedyra er hunddyr og er derfor ett vesentlig bidrag til økonomien på ammekubruket. Kvigekjøttproduksjon krever en plan på lik linje som oksekjøttproduksjon for å lykkes, men er noe mer krevende i forhold til avleiring av fett og rett slaktetidspunkt.

Kvigeslakt vil si hunddyr med slaktealder fra 301 dager til 730 dager (2 år).

Ulike fremføringsregimer

Fremføring av kviger til slakt uten beite fra avvenning til slakt.

- Passer best for tidlig vårfødte kviger som slaktes før beitesesongen.
- Leveres til slakt på topppris i mai/juni.

Fremføring av kviger til slakt med en beitesommer fra avvenning til slakt.

- Passer best for seint vårfødte eller høstfødte kviger.
- Bruk av innmarksbeite og utmarksbeite.
- Kan være behov for slutføring inne, dette avhenger av kvalitet og tilvekst på beite.


Prinsipper i fôrplanlegging til slaktekviger

1. Slaktetidspunkt må bestemmes ut i fra vekt og alder på kvigekalven ved innsett, plass og fôrbeholdning.
2. Sterk føring fører til tidligere avleiring av fett ved lavere vekt enn ved svakere føring. Generelt avleirer kviger fett ved en vesentlig lavere vekt og alder enn okser. Det er også en forskjell mellom raser når de avleirer fett ut i fra når de er kjønnsmodne.

3. Lag en oversikt over mengde og kvalitet på tilgjengelige fôrmidler på gården.
4. Sett opp en fôrplan for kvigene i ulike perioder, for eksempel hver 3. måned. Behov for kraftfôr vil avhenge av kvalitet på grovfôr. Husk at de fleste fôrplaner legger opp til fri tilgang på grovfôr.
5. Sørg for at behovet for mineraler og vitaminer også dekkes.
6. God tilgang på vann av god kvalitet er avgjørende for god tilvekst.
7. Ta tilvekstmålinger underveis og sjekk om tilveksten er i henhold til fôrplanen.

Oppstalling

Oppstalling av kviger og okser i samme fjøs kan skape uro og redusert tilvekst på oksene i forbindelse med brunst. Dette bør en prøve å ta hensyn til ved plassering og gruppering av dyr. I nybygg (etter 2004) for oppstalling av hunddyr skal alle binger ha liggebåser, eller liggeareal med tett gulv der alle dyra kan ligge samtidig. Dette er i henhold til forskrift om hold av storfe.



§10 – Forskrift om hold av storfe

Storfe skal sikres mulighet for fri bevegelse og mosjon på beite i minimum 8 uker i løpet av sommerhalvåret.

Storfe som er oppstallet i båsfjøs, skal sikres mulighet for fri bevegelse og mosjon på beite i minimum 16 uker i løpet av sommerhalvåret.

Lette raser

Det er kviger med for eksempel 50 % eller mer Hereford, Aberdeen Angus og Tyroler Gråfe. Disse rasene kjennetegnes ved at de er tidlig slaktemodne

og avleirer fett ved en lavere alder og vekt enn de tunge rasene.

Tabellen under viser kraftførmengder i forhold til grovførkvalitet der framføringstiden er satt til 15–17 mnd alder.

Ønsket tilvekst	Slaktevekt/ Levendevekt	Tidlig høsta, moderat gjæring (0,91 FEm)	Middels høstetid, moderat gjæring (0,86 FEm)	Seint høsta, moderat gjæring (0,81 FEm)
750-850 g/dag	230 kg/470 kg	1,5 kg/dag Formel Biff Kompakt eller Formel Linnea Biff	2,0 kg/dag Formel Linnea Biff eller Formel Biff	2,5 kg/dag Formel Linnea Biff eller Formel Biff


Tunge raser

Det er kviger med for eksempel 50 % eller mer Limousin, Charolais, Simmental og Blonde A` Qutaine. Disse rasene kjennetegnes ved at de er seint slaktemodne

og avleirer fett ved en høyere alder og vekt enn de lette rasene.

Tabellen viser kraftførmengder i forhold til grovførkvalitet der framføringstiden er satt til 15–17 mnd alder.

Ønsket tilvekst	Slaktevekt/ Levendevekt	Tidlig høsta, moderat gjæring (0,91 FEm)	Middels høstetid, moderat gjæring (0,86 FEm)	Seint høsta, moderat gjæring (0,81 FEm)
1000-1100 g/dag	275 kg/530 kg	2,0 kg/dag Formel Biff Kompakt eller Formel Linnea Biff	2,5 kg/dag Formel Linnea Biff eller Formel Biff	3,0 kg/dag Formel Linnea Biff eller Formel Biff



Fett

For å lykkes med kvigekjøttproduksjonen er du avhengig av å treffe med slaktevekt og fettgruppe. Det gis ikke kvalitetstilskudd til slakt med fettgruppe 4 eller høyere. Det betyr at man må unngå å levere slakt i de høye fettgruppene. Er man usikker så er det bedre å levere litt for tidlig enn for seint, og ser du at det er for seint så er slanking en mulighet på kviger.

Fettgruppe fra 3 til og med 3+ må man akseptere i denne produksjonen. Sluttvekta når kvigene er slaktemodne vil variere ut i fra rasekombinasjon, og avhenger av rammestørrelse/voksenvekt til individet i større grad enn alder.

Tips til å lykkes i kvigekjøttproduksjonen

- Friske dyr som vokser godt.
- Klipp dyra ved innsett.
- Legg en plan fra innsett til utslakting.
- Følg opp underveis i forhold til tilvekst og juster fôrplan underveis.
- Utnytt prisløypa og slakt på høyest mulig pris.
- Utnytt mulighetene i Nortura sine ulike varestrømmer.
- Unngå dyr i fettgruppe 4 og over.
- Er det mistanke om tyvparring så følg med på dyret.



Kontakt gjerne din Norturarådgiver for spørsmål!



Tlf. **955 18 400**

medlem.nortura.no/storfe

 **Nortura**